

环磷腺苷葡胺注射液说明书


请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称: 环磷腺苷葡胺注射液
英文名称: Meglumine Adenosine Cyclophosphate Injection
汉语拼音: Huanlinxiangan pu'an Zhushuye

【成份】

化学名称: 6-氨基-9-β-D-呋喃核糖基-9H-嘌呤-4',5'-环磷酸-1-脱氧-1-甲氨基-D-山梨醇盐
化学结构式:



分子式: $C_{10}H_{12}N_5O_6P \cdot C_7H_{17}NO_5$
分子量: 524.42

【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体。

【适应症】用于心力衰竭、心肌炎、病窦综合症、冠心病及心肌病，也可用于心律失常的辅助治疗。

【规格】2ml:30mg
2ml:60mg
10ml:150mg

【用法用量】

一次60~180mg，一日1次，加于200~500ml 5%葡萄糖注射液中稀释后静脉滴注。

【不良反应】偶见心悸、心慌、头晕等症状。

【禁忌】对本品过敏者禁用。

41-471B

【注意事项】

- 1、滴注不应太快，用量在150mg以上应在90分钟以上滴完。
- 2、滴注时如遇心悸、心慌，应停止用药，停药后症状自行消失。
- 3、当药品性状发生改变时禁止使用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】尚不明确。

【儿童用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【老年用药】尚未发现本品老年用药和成人用药存在明显差异。

【药物相互作用】本品禁与氨茶碱同时静脉给药。

【药物过量】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药理毒理】

环磷腺苷葡胺为非洋地黄类强心剂，具有正性肌力作用，能增加心肌收缩力，改善心脏泵血功能，有扩张血管作用，可降低心肌耗氧量；改善心肌细胞代谢，保护缺血、缺氧的心肌；能够改善窦房结P细胞功能。

【药代动力学】

环磷腺苷葡胺进入人体，在血液中的半衰期约为60~150min。由于其有较好的亲脂性，较易透过脂溶性细胞膜进入心肌细胞内发挥作用。其代谢途径为经磷酸二酯酶分解形成5'-AMP，再经5'-AMP酶降解为腺苷和磷酸。环磷腺苷葡胺在用药后10~20min开始作用，显效高峰时间在1~2小时，药效消失时间在6~8小时。

【贮藏】遮光，密闭保存。

【包装】2ml: 30mg规格: 低硼硅玻璃安瓿装，6支/盒，10支/盒。
2ml: 60mg规格: 低硼硅玻璃安瓿装，6支/盒。
10ml: 150mg规格: 低硼硅玻璃管制注射剂瓶装，2支/盒。

【有效期】24个月。

【执行标准】国家食品药品监督管理局标准WS1-XG-021-2000

【批准文号】2ml: 30mg规格: 国药准字H20003530
2ml: 60mg规格: 国药准字H20044331
10ml: 150mg规格: 国药准字H20044332

【药品上市许可持有人及生产企业】

企业名称: 江苏万邦生化医药集团有限责任公司
注册地址: 江苏省徐州市金山桥开发区综合区洞山南侧
邮政编码: 221004
电话号码: 0516-83817033
传真号码: 0516-87981650
咨询电话: 400-886-8282
网 址: www.chinawanbang.com